

Таблица 1. Особенности функционирования больных РМЖ в зависимости от вида получаемого лечения

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
Хирургическое лечение: молочная железа	Анатомо-физиологический уровень				
	<p>s720 Структура области плеча</p> <p>s730 Структура верхней конечности</p> <p>s810 Структура кожного покрова</p> <p>d430 Поднятие и перенос объектов</p> <p>d445 Использование кисти и руки</p> <p>d430-d449 Перенос, перемещение и манипулирование объектами</p> <p>b455 Функции толерантности к физической нагрузке</p>	<p>- Оценка структуры кожного покрова;</p> <p>- оценка силы верхней конечности, диапазона движения;</p> <p>- совместное активное и пассивное движение;</p> <p>- длина мышц, растяжимость мягкой ткани и гибкость;</p> <p>- чувствительность в кожных покровах;</p> <p>- боль в определенных частях тела;</p> <p>- мышечная сила и выносливость во время функциональных действий;</p>	<p>- Нормально заживающая область п/о раны, без признаков нагноения или воспаления;</p> <p>- двигательная активность в целом не нарушена, незначительное сокращение в объеме/амплитуде движений верхней конечности;</p> <p>- умеренная болезненность в области п/о раны;</p> <p>- чувствительность в области п/о раны незначительно нарушена;</p> <p>- уровень утомляемости прежний или</p>	<p>- Нормально заживающая область п/о раны, без признаков нагноения или воспаления;</p> <p>- двигательная активность в целом снижена, имеется сокращение в объеме/амплитуде движений верхней конечности;</p> <p>- выраженная болезненность в области п/о раны;</p> <p>- незначительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- незначительное снижение физической выносливости;</p> <p>- значительное нарушение чувствительно кожных покровов в области п/о раны;</p> <p>- способность к манипулированию предметами снижена, значительные трудности в подвижности мелких суставов, моторике кистей рук;</p> <p>- пациент быстро утомляется;</p>	<p>- Область п/о раны воспалена, имеются признаки нагноения;</p> <p>- двигательная активность значительно снижена, имеется значительное сокращение в объеме/амплитуде движений верхней конечности;</p> <p>- выраженная болезненность в области п/о раны;</p> <p>- значительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- способность к манипулированию предметами значительно снижена, пациент не способен выполнять хватательные движения,</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	b4550 Общая физическая выносливость b4551 Аэробный резерв b4552 Утомляемость b280 Ощущение боли	<ul style="list-style-type: none"> - способность к манипулированию предметами/объектами (перенос, поднятие, толкание, подтягивание, вращение); - мышечное напряжение; - оценка аэробного резерва; - оценка утомляемости и уровня выносливости во время минимальных физических нагрузок 	<ul style="list-style-type: none"> незначительно повышен; - уровень выносливости прежний или незначительно снижен; - незначительно снижена способность к манипулированию предметами; - незначительно снижена подвижность мелких суставов, незначительно снижена мелкая моторика рук; - сохранность или незначительное снижение мышечного тонуса; - сохранность или незначительное снижение 	<ul style="list-style-type: none"> - аэробный резерв значительно снижен, отмечается одышка во время выполнения обычной физической нагрузки 	<ul style="list-style-type: none"> вращательные движения; - значительное снижение толерантности к минимальным физическим нагрузкам; - быстрая утомляемость; - значительное снижение аэробного резерва, одышка при смене положения или затруднения дыхания в покое

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			физической выносливости; - аэробный резерв снижен		
Психофизиологический уровень					
	<p>b122 Глобальные психо-социальные функции</p> <p>b126 Темперамент и личностные функции</p> <p>b130 Волевые и побудительные функции</p> <p>b134 Функции сна</p> <p>b140 Функции внимания</p> <p>b147 Психомоторные функции</p> <p>b152 Функции эмоций</p>	<p>- Оценка скорости психомоторных реакций;</p> <p>- оценка сохранности и функционирования высших психических функций (память, внимание, мышление, восприятие);</p> <p>- оценка качества ночного сна;</p> <p>- оценка интенсивности и условий манифестации психических реакций;</p> <p>- оценка способности совладания со стрессом;</p>	<p>- Уровень когнитивного развития соответствует возрасту;</p> <p>- скорость психомоторных реакций незначительно снижена или сохранена;</p> <p>- память на недавние события незначительно снижена или сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, сосредоточение внимания незначительно снижено или</p>	<p>- Когнитивный уровень снижен, но структуры ГМ сохранены;</p> <p>- скорость психомоторных реакций снижена, отмечается заторможенность;</p> <p>- память на недавние события и/или события прошлого, имена, лица снижена, но пациент узнает знакомых людей, называет предметы, ориентирован в пространстве и личности;</p> <p>- концентрация внимания снижена, быстрая утомляемость, низкая или высокая лабильность внимания;</p> <p>- лабильность мышления, редкая утрата контекста диалога;</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие симптомы психического расстройства,</p>	<p>- Когнитивный уровень значительно снижен, нарушены структуры ГМ;</p> <p>- скорость психомоторных реакций значительно снижена, заторможенность;</p> <p>- отмечается двигательная расторможенность;</p> <p>- память на события настоящего и прошлого значительно снижена;</p> <p>- есть симптомы кратковременной дезориентации в пространстве;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>b160 Функции мышления</p> <p>b164 Познавательные функции высокого уровня</p> <p>d240 Преодоление стресса и других психологических нагрузок</p>	- оценка когнитивных функций	<p>сохранено в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, содержательность мышления незначительно снижена (без утраты контекста диалога) или сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- психоэмоциональный фон стабильный или пациент демонстрирует психические реакции по типу нозогений, манифестирующие в течении от 3 нед до 3 мес</p>	манифестирующие в течение 4 мес и дольше	<p>- концентрация внимания значительно снижена;</p> <p>- признаки нарушения мышления: вязкость, склонность к беспредметным рассуждениям;</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие признаки психического расстройства, манифестирующие в течение 4 и более мес</p>
Социально-бытовой уровень					
	<p>d230 Выполнение повседневного распорядка</p> <p>d510 Мытье</p>	- Уровень мотивации, воли к деятельности;	- Навыки самообслуживания сохранены или незначительно снижены за счет	- Навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности;	- Навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	d540 Одевание d550 Прием пищи d560 Питье d570 Забота о своем здоровье d630 Приготовление пищи d640 Выполнение работы по дому	<ul style="list-style-type: none"> - уровень самообслуживания; - планирование и анализ задачи; - ловкость и координация; - рисковое поведение. 	<ul style="list-style-type: none"> функциональных ограничений верхней конечности, незначительных болевых ощущений; - мотивация к деятельности сохранена или незначительно снижена в ситуации утомляемости; - аппетит достаточный или незначительно снижен; - сохранен или не критично снижен навык планирования и распределения времени с учетом физического состояния и трудности задачи; 	<ul style="list-style-type: none"> - мотивация к деятельности снижена в ситуации утомляемости; - воля к деятельности незначительно снижена, отмечается тенденция астенизации, манифестация астено-апатичных реакций; - аппетит снижен; - навыки планирования значительно снижены, пациент не способен соотносить особенности физического состояния и сложность выполняемых задач; - незначительно нарушена координация движений; - отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, тенденция рискованного поведения 	<ul style="list-style-type: none"> конечности - мотивация к деятельности значительно снижена; - воля к деятельности значительно снижена, отмечаются реакции апатии, - отказ от еды; - значительное снижение опрятности, упорядоченности в поведении; - пациент не способен выполнять работу по дому; - значительно нарушена координация движений; - отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, злоупотребление алкоголем, ПАВ, табакокурением

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<ul style="list-style-type: none"> - сохранена координация движений; - низкий уровень рискованного поведения: соблюдение рекомендаций лечащего врача и мед. персонала, отказ от злоупотребления спиртными напитками, табакокурением, ПАВ 		
Социально-средовый уровень					
	<p>d760 Семейные отношения</p> <p>d770 Интимные отношения</p> <p>b640 Сексуальные функции</p>	<ul style="list-style-type: none"> - включенность в социальное взаимодействие; - включенность в межличностные отношения с партнером, в том числе интимные, сексуальные; - включенность в отношения с детьми, 	<ul style="list-style-type: none"> - интимные отношения с супругом прежние, сексуальная жизнь активная или незначительно ограничена в связи с функциональным состоянием в п/о период; 	<ul style="list-style-type: none"> - отношения с партнером конфликтные, снижение качества сексуальной жизни, снижение либидо; - снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается эмоциональная изоляция пациента, замкнутость, погруженность в собственные переживания; 	<ul style="list-style-type: none"> - отношения с партнером конфликтные, сексуальная жизнь отсутствует; - значительно снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается полная социальная изоляция

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
		<p>близкими родственника;</p> <p>- оценка образа тела, сексуальности, нарциссичности.</p>	<p>- уровень коммуникации с близкими незначительно снижен или прежний;</p> <p>- отмечаются незначительные трудности, конфликтность в отношениях с детьми, партнером;</p> <p>- адекватная объему операции оценка образа тела, сексуальности, нормальное проявление нарциссизма в оценке себя.</p>	<p>- отмечается конфликтность в отношениях с детьми, отстраненность, либо тенденции гиперопеки;</p> <p>- присутствуют некоторые признаки дисморфофобии, патологизация нарциссизма (в форме самоупреков, недовольства собой), снижение чувства женственности, сексуальности.</p>	<p>пациента, вплоть до отказа в коммуникации;</p> <p>- отмечается отказ участия в жизни детей, либо тенденции гиперопеки, чрезмерная фиксация на личности близкого;</p> <p>- выраженные симптомы дисморфофобии, отрицание сексуальности, женственности.</p>
Профессионально-трудоустройство					
	d845 Получение работы, выполнение и прекращение трудовых отношений	<p>- уровень физического функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности;</p>	<p>- Трудности в поиске работы минимальные или отсутствуют;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных</p>	<p>- Отмечаются трудности в поиске работы, трудности при вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные</p>	<p>- Отмечаются значительные трудности в поиске работы, трудности при вступлении в трудовые отношения;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
		<p>- уровень психического функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности</p> <p>- адаптация к условиям труда;</p> <p>- уровень физической и психической устойчивости в условиях выполнения профессиональной деятельности</p>	<p>задач минимальны или отсутствуют;</p> <p>- трудности при интеграции в новый коллектив, возвращении в прежний минимальны или отсутствуют;</p> <p>- отсутствует синдром социальной изоляции;</p> <p>- физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач отвечает возрастным нормам или незначительно повышена.</p>	<p>психофизиологическими, психическими или соматическими причинами;</p> <p>- трудности при интеграции в коллектив, социум;</p> <p>- синдром социальной изоляции представлен частично в форме отсутствия желаний вступать в коммуникативные контакты с окружающими, в том числе близкими;</p> <p>- быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач.</p>	<p>- значительные трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами или невозможность выполнения прежней профессиональной деятельности;</p> <p>- значительные трудности при интеграции в коллектив, социум или невозможность социальной адаптации;</p> <p>- синдром социальной изоляции представлен полностью, наблюдается отказ от социальных контактов;</p> <p>- быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
					профессиональных задач.
Хирургическое лечение: лимфодиссекция	Анатомо-физиологический уровень				
	<p>s810 Структура кожного покрова</p> <p>s420 Структура иммунной системы</p> <p>s4200 Лимфатические сосуды</p> <p>s4201 Лимфатические узлы</p> <p>b280 Ощущение боли</p> <p>b435 Функции иммунной системы</p> <p>b4352 Функции лимфатических сосудов</p> <p>b4353 Функции, связанные с железами, расположенными</p>	<p>- оценка силы верхней конечности, диапазона движения;</p> <p>- совместное активное и пассивное движение;</p> <p>- длина мышц, растяжимость мягкой ткани и гибкость;</p> <p>- боль в определенных частях тела;</p> <p>- чувствительность в кожных покровах;</p> <p>- воспалительные изменения кожных покровов;</p> <p>- мышечная сила и выносливость</p>	<p>- Нормально заживающая область п/о раны, без признаков нагноения или воспаления;</p> <p>- лимфатический отек выражен незначительно и носит приходящий характер (нет разницы в окружностях обеих рук);</p> <p>- чувствительность в области п/о раны незначительно нарушена;</p> <p>- умеренная болезненность в области п/о раны;</p> <p>- двигательная активность в целом не нарушена,</p>	<p>- Нормально заживающая область п/о раны, без признаков нагноения или воспаления;</p> <p>- лимфатический отек распространяется на предплечье и кисть (разница со здоровой рукой менее 4 см);</p> <p>- значительное нарушение чувствительно кожных покровов в области п/о раны;</p> <p>- выраженная болезненность в области п/о раны;</p> <p>- двигательная активность в целом снижена, имеется сокращение в объеме/амплитуде движений верхней конечности;</p> <p>- незначительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- незначительное снижение физической выносливости;</p> <p>- нет внешних изменений тканей;</p>	<p>- область п/о раны воспалена, имеются признаки нагноения;</p> <p>- кожа имеет признаки воспаления (рожистое воспаление), ткани изменены, имеются жировые отложения;</p> <p>- лимфатический отек распространен по всей верхней конечности (разница при обмере более 4 см, но менее 6);</p> <p>- двигательная активность значительно снижена, имеется значительное сокращение в объеме/амплитуде движений верхней конечности;</p> <p>- выраженная болезненность в области п/о раны;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>по ходу лимфатических сосудов.</p> <p>b455 Функции толерантности к физической нагрузке</p> <p>b4550 Общая физическая выносливость</p> <p>b4552 Утомляемость</p> <p>d430-d449 Перенос, перемещение и манипулирование объектами</p>	<p>во время функциональных действий;</p> <p>- мышечное напряжение;</p> <p>- лимфатический отек;</p> <p>- способность к манипулированию предметами/объектами (перенос, поднятие, толкание, подтягивание, вращение).</p>	<p>незначительное сокращение в объеме/амплитуде движений верхней конечности;</p> <p>- уровень утомляемости прежний или незначительно повышен;</p> <p>- уровень выносливости прежний или незначительно снижен;</p> <p>- незначительно снижена способность к манипулированию предметами;</p> <p>- незначительно снижена подвижность мелких суставов, незначительно снижена мелкая моторика рук;</p>	<p>- способность к манипулированию предметами снижена, значительные трудности в подвижности мелких суставов, моторике кистей рук;</p> <p>- пациент быстро утомляется.</p>	<p>- значительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- способность к манипулированию предметами значительно снижена, пациент не способен выполнять хватательные движения, вращательные движения;</p> <p>- значительное снижение толерантности к минимальным физическим нагрузкам;</p> <p>- быстрая утомляемость.</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<ul style="list-style-type: none"> - сохранность или незначительное снижение мышечного тонуса; - сохранность или незначительное снижение физической выносливости; 		
Психофизиологический уровень					
	<p>b122 Глобальные психосоциальные функции</p> <p>b126 Темперамент и личностные функции</p> <p>b130 Волевые и побудительные функции</p> <p>b134 Функции сна</p> <p>b140 Функции внимания</p>	<ul style="list-style-type: none"> - оценка скорости психомоторных реакций; - оценка сохранности и функционирования высших психических функций (память, внимание, мышление, восприятие); - оценка качества ночного сна; - оценка интенсивности и условий манифестации 	<ul style="list-style-type: none"> - уровень когнитивного развития соответствует возрасту; - скорость психомоторных реакций незначительно снижена или сохранена; - память на недавние события незначительно снижена или 	<ul style="list-style-type: none"> - когнитивный уровень снижен, но структуры ГМ сохранны; - скорость психомоторных реакций снижена, отмечается заторможенность; - память на недавние события и/или события прошлого, имена, лица снижена, но пациент узнает знакомых людей, называет предметы, ориентирован в пространстве и личности; - концентрация внимания снижена, быстрая утомляемость, низкая или высокая лабильность внимания; 	<ul style="list-style-type: none"> - когнитивный уровень значительно снижен, нарушены структуры ГМ; - скорость психомоторных реакций значительно снижена, заторможенность; - отмечается двигательная расторможенность; - память на события настоящего и

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>b147 Психомоторные функции</p> <p>b152 Функции эмоций</p> <p>b160 Функции мышления</p> <p>b164 Познавательные функции высокого уровня</p> <p>d240 Преодоление стресса и других психологических нагрузок</p>	<p>психических реакций;</p> <p>- оценка способности совладания со стрессом;</p> <p>- оценка когнитивных функций</p>	<p>сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, сосредоточение внимания незначительно снижено или сохранено в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, содержательность мышления незначительно снижена (без утраты контекста диалога) или сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- ночной сон стабильный или прерывистый на фоне болевых ощущений, тревоги (общая продолжительность не менее 7-8 часов);</p> <p>- психоэмоциональный фон стабильный</p>	<p>- лабильность мышления, редкая утрата контекста диалога;</p> <p>- нестабильный ночной сон (общая продолжительность не менее 5-6 часов);</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие симптомы психического расстройства, манифестирующие в течение 4-х месяцев и дольше.</p>	<p>прошлого значительно снижена;</p> <p>- есть симптомы кратковременной дезориентации в пространстве;</p> <p>- концентрация внимания значительно снижена;</p> <p>- признаки нарушения мышления: вязкость, склонность к беспредметным рассуждениям;</p> <p>- симптомы бессонницы, признаки психофизиологического возбуждения при отходе ко сну или после пробуждения (общая продолжительность не менее 3-4 часов);</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие признаки психического расстройства,</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			или пациент демонстрирует психические реакции по типу нозогений, манифестирующие в течении от 3 недель до 3-х месяцев.		манифестирующие в течение 4-х и более месяцев.
Социально-бытовой уровень					
	<p>d230 Выполнение повседневного распорядка</p> <p>d510 Мытье</p> <p>d540 Одевание</p> <p>d550 Прием пищи</p> <p>d560 Питье</p> <p>d570 Забота о своем здоровье</p> <p>d630 Приготовление пищи</p> <p>d640 Выполнение работы по дому</p>	<p>- уровень мотивации, воли к деятельности;</p> <p>- уровень самообслуживания;</p> <p>- планирование и анализ задачи;</p> <p>- ловкость и координация;</p> <p>- рисковое поведение.</p>	<p>- навыки самообслуживания сохранены или незначительно снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности, незначительных болевых ощущений;</p> <p>- мотивация к деятельности сохранена или незначительно снижена в ситуации утомляемости;</p>	<p>- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности;</p> <p>- мотивация к деятельности снижена в ситуации утомляемости;</p> <p>- воля к деятельности незначительно снижена, отмечается тенденция астенизации, манифестация астено-апатичных реакций;</p> <p>- аппетит снижен;</p> <p>- навыки планирования значительно снижены, пациент не способен соотносить особенности физического</p>	<p>- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности - мотивация к деятельности значительно снижена;</p> <p>- воля к деятельности значительно снижена, отмечаются реакции апатии,</p> <p>- отказ от еды;</p> <p>- значительное снижение опрятности,</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<ul style="list-style-type: none"> - аппетит достаточный или незначительно снижен; - сохранен или не критично снижен навык планирования и распределения времени с учетом физического состояния и трудности задачи; - сохранена координация движений; - низкий уровень рискованного поведения: соблюдение рекомендаций лечащего врача и мед. персонала, отказ от злоупотребления спиртными напитками, табакокурением, ПАВ. 	<ul style="list-style-type: none"> состояния и сложность выполняемых задач; - незначительно нарушена координация движений; - отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, тенденция рискованного поведения. 	<ul style="list-style-type: none"> упорядоченности в поведении; - пациент не способен выполнять работу по дому; - значительно нарушена координация движений; - отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, злоупотребление алкоголем, ПАВ, табакокурением.

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	Социально-средовый уровень				
	d760 Семейные отношения d770 Интимные отношения b640 Сексуальные функции	<ul style="list-style-type: none"> - включенность в социальное взаимодействие; - включенность в межличностные отношения с партнером, в том числе интимные, сексуальные; - включенность в отношения с детьми, близкими родственника. 	<ul style="list-style-type: none"> - интимные отношения с супругом прежние, сексуальная жизнь активная или незначительно ограничена в связи с функциональным состоянием в п/о период; - уровень коммуникации с близкими незначительно снижен или прежний; - отмечаются незначительные трудности, конфликтность в отношениях с детьми, партнером. 	<ul style="list-style-type: none"> - отношения с партнером конфликтные, снижение качества сексуальной жизни, снижение либидо; - снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается эмоциональная изоляция пациента, замкнутость, погруженность в собственные переживания; - отмечается конфликтность в отношениях с детьми, отстраненность, либо тенденции гиперопеки. 	<ul style="list-style-type: none"> - отношения с партнером конфликтные, сексуальная жизнь отсутствует; - значительно снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается полная социальная изоляция пациента, вплоть до отказа в коммуникации; - отмечается отказ участия в жизни детей, либо тенденции гиперопеки, чрезмерная фиксация на личности близкого.
	Профессионально-трудовой уровень				
	d845 Получение работы,	- уровень физического	- Трудности в поиске работы	- Отмечаются трудности в поиске работы, трудности при	- Отмечаются значительные

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
выполнение и прекращение трудовых отношений	и	<p>функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности;</p> <p>- уровень психического функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности</p> <p>- адаптация к условиям труда;</p> <p>- уровень физической и психической устойчивости в условиях выполнения профессиональной деятельности</p>	<p>минимальные или отсутствуют;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач минимальны или отсутствуют;</p> <p>- трудности при интеграции в новый коллектив, возвращении в прежний минимальны или отсутствуют;</p> <p>- отсутствует синдром социальной изоляции;</p> <p>- физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач отвечает возрастным нормам или незначительно повышена.</p>	<p>вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами;</p> <p>- трудности при интеграции в коллектив, социум;</p> <p>- синдром социальной изоляции представлен частично в форме отсутствия желаний вступать в коммуникативные контакты с окружающими, в том числе близкими;</p> <p>- быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач.</p>	<p>трудности в поиске работы, трудности при вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- значительные трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами или невозможность выполнения прежней профессиональной деятельности;</p> <p>- значительные трудности при интеграции в коллектив, социум или невозможность социальной адаптации;</p> <p>- синдром социальной изоляции представлен полностью, наблюдается отказ от социальных контактов;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
					- быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач.
Химиотерапия: Adriamycin	Анатомо-физиологический уровень				
	b410 Функции сердца	- оценка сердечной деятельности;	- отсутствуют явления нарушений сердечной деятельности;	- учащенное или неритмичное сердцебиение;	- сердечная недостаточность;
	b415 Функции кровеносных сосудов	- оценка АД; - тошнота, рвота;	- отсутствует отечность стоп и лодыжек;	- отсутствует отечность стоп и лодыжек;	- одышка в покое и при минимальных физических нагрузках;
	b420 Функции артериального давления	- уровень физической активности, соответствующий возрасту;	- АД соответствует индивидуальной норме;	- незначительная лабильность АД, купируемая нормотензивными/гипотензивными препаратами;	- отечностью стоп и лодыжек;
	b435 Функции иммунной системы	- передвижение во время функциональных действий;	- тошнота отсутствует или слабо выражена;	- тошнота умерено выражена, частично или полностью купируется антиэметическими препаратами;	- острая предсердная и желудочковая аритмия;
	d450-d469 Ходьба и передвижение	с или без использования вспомогательных технологий;	- рвота отсутствует;	- рвота отсутствует;	- тромбоцитопения, лейкопения;
	b455 Функции толерантности к физической нагрузке		- двигательная активность в целом не нарушена, соответствует возрасту;	- двигательная активность снижена, не соответствует возрасту;	- лабильность АД;
			- пациент быстро утомляется;	- выраженная тошнота, рвота;	
					- двигательная активность значительно снижена, большую часть

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>b4550 Общая физическая выносливость</p> <p>b4551 Аэробный резерв</p> <p>b4552 Утомляемость</p>	<p>- толерантность к физическим нагрузкам;</p> <p>- аэробная выносливость;</p> <p>- уровень утомляемости;</p>	<p>- уровень утомляемости прежний или незначительно повышен;</p> <p>- уровень выносливости прежний или незначительно снижен;</p> <p>- незначительно снижена способность к манипулированию предметами;</p> <p>- сохранность или незначительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- сохранность или незначительное снижение физической выносливости;</p> <p>- аэробный резерв снижен, одышка обычных</p>	<p>- уровень выносливости незначительно снижен;</p> <p>- незначительно снижена способность к манипулированию предметами;</p> <p>- незначительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- незначительное снижение физической выносливости;</p> <p>- аэробный резерв снижен, одышка при минимальных физических нагрузках.</p>	<p>времени пациент проводит в постели;</p> <p>- пациент быстро утомляется;</p> <p>- значительно снижена способность к манипулированию предметами;</p> <p>- значительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- значительное снижение физической выносливости.</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			физических нагрузках.		
	Психофизиологический уровень				
	b110 Функции сознания b114 Функции ориентированности b122 Глобальные психосоциальные функции b126 Темперамент и личностные функции b130 Волевые и побудительные функции b134 Функции сна b140 Функции внимания b147 Психомоторные функции	- оценка скорости психомоторных реакций; - оценка сохранности и функционирования высших психических функций (память, мышление, восприятие); - оценка качества ночного сна; - оценка интенсивности и условий манифестации психических реакций; - оценка способности совладания со стрессом;	- уровень когнитивного развития соответствует возрасту; - скорость психомоторных реакций незначительно снижена или сохранена; - память на недавние события незначительно снижена или сохранена в прежнем объеме; - лабильность, сосредоточение внимания незначительно снижено или сохранено в прежнем объеме;	- когнитивный уровень снижен, но структуры ГМ сохранены; - скорость психомоторных реакций снижена, отмечается заторможенность; - память на недавние события и/или события прошлого, имена, лица снижена, но пациент узнает знакомых людей, называет предметы, ориентирован в пространстве и личности; - концентрация внимания снижена, быстрая утомляемость, низкая или высокая лабильность внимания; - лабильность мышления, редкая утрата контекста диалога; - психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие симптомы психического расстройства, манифестирующие в течение 4-х месяцев и дольше.	- когнитивный уровень значительно снижен, нарушены структуры ГМ; - скорость психомоторных реакций значительно снижена, заторможенность; - отмечается двигательная расторможенность; - память на события настоящего и прошлого значительно снижена; - есть симптомы кратковременной дезориентации в пространстве; - концентрация внимания значительно снижена;

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>b152 Функции эмоций</p> <p>b160 Функции мышления</p> <p>b164 Познавательные функции высокого уровня</p> <p>d240 Преодоление стресса и других психологических нагрузок</p>	<p>- оценка когнитивных функций</p>	<p>- лабильность, содержательность мышления незначительно снижена (без утраты контекста диалога) или сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- психоэмоциональный фон стабильный или пациент демонстрирует психические реакции по типу нозогений, манифестирующие в течении от 3 недель до 3-х месяцев.</p>		<p>- признаки нарушения мышления: вязкость, склонность к беспредметным рассуждениям;</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие признаки психического расстройства, манифестирующие в течение 4-х и более месяцев.</p>
	Социально-бытовой уровень				
	<p>d230 Выполнение повседневного распорядка</p> <p>d510 Мытье</p> <p>d540 Одевание</p>	<p>- уровень мотивации, воли к деятельности;</p> <p>- уровень самообслуживания;</p>	<p>- навыки самообслуживания сохранены или незначительно снижены за счет функциональных ограничений</p>	<p>- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности;</p>	<p>- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности - мотивация к</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>d550 Прием пищи</p> <p>d560 Питье</p> <p>d570 Забота о своем здоровье</p> <p>d630 Приготовление пищи</p> <p>d640 Выполнение работы по дому</p>	<p>- планирование и анализ задачи;</p> <p>- ловкость и координация;</p> <p>- рисковое поведение.</p>	<p>верхней конечности, незначительных болевых ощущений;</p> <p>- мотивация к деятельности сохранена или незначительно снижена в ситуации утомляемости;</p> <p>- аппетит достаточный или незначительно снижен;</p> <p>- сохранен или не критично снижен навык планирования и распределения времени с учетом физического состояния и трудности задачи;</p> <p>- сохранена координация движений;</p>	<p>- мотивация к деятельности снижена в ситуации утомляемости;</p> <p>- воля к деятельности незначительно снижена, отмечается тенденция астенизации, манифестация астено-апатичных реакций;</p> <p>- аппетит снижен;</p> <p>- навыки планирования значительно снижены, пациент не способен соотносить особенности физического состояния и сложность выполняемых задач;</p> <p>- незначительно нарушена координация движений;</p> <p>- отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, тенденция рискованного поведения.</p>	<p>деятельности значительно снижена;</p> <p>- воля к деятельности значительно снижена, отмечаются реакции апатии,</p> <p>- отказ от еды;</p> <p>- значительное снижение опрятности, упорядоченности в поведении;</p> <p>- пациент не способен выполнять работу по дому;</p> <p>- значительно нарушена координация движений;</p> <p>- отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, злоупотребление алкоголем, ПАВ, табакокурением.</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<p>- низкий уровень рискового поведения: соблюдение рекомендаций лечащего врача и мед. персонала, отказ от злоупотребления спиртными напитками, табакокурением, ПАВ.</p>		
Социально-средовый уровень					
	<p>d760 Семейные отношения d770 Интимные отношения b640 Сексуальные функции</p>	<p>- включенность в социальное взаимодействие; - включенность в межличностные отношения с партнером, в том числе интимные, сексуальные; - включенность в отношения с детьми, близкими родственника.</p>	<p>- интимные отношения с супругом прежние, сексуальная жизнь активная или незначительно ограничена в связи с функциональным состоянием в п/о период; - уровень коммуникации с близкими незначительно</p>	<p>- отношения с партнером конфликтные, снижение качества сексуальной жизни, снижение либидо; - снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается эмоциональная изоляция пациента, замкнутость, погруженность в собственные переживания; - отмечается конфликтность в отношениях с детьми,</p>	<p>- отношения с партнером конфликтные, сексуальная жизнь отсутствует; - значительно снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается полная социальная изоляция пациента, вплоть до отказа в коммуникации;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<p>снижен или прежний;</p> <p>- отмечаются незначительные трудности, конфликтность в отношениях с детьми, партнером.</p>	отстраненность, либо тенденции гиперопеки.	<p>- отмечается отказ участия в жизни детей, либо тенденции гиперопеки, чрезмерная фиксация на личности близкого.</p>
Профессионально-трудоустройство					
	d845 Получение работы, выполнение и прекращение трудовых отношений	<p>- уровень физического функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности;</p> <p>- уровень психического функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности</p> <p>- адаптация к условиям труда;</p> <p>- уровень физической и</p>	<p>- Трудности в поиске работы минимальные или отсутствуют;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач минимальны или отсутствуют;</p> <p>- трудности при интеграции в новый коллектив, возвращении в прежний минимальны или отсутствуют;</p> <p>- отсутствует синдром</p>	<p>- Отмечаются трудности в поиске работы, трудности при вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами;</p> <p>- трудности при интеграции в коллектив, социум;</p> <p>- синдром социальной изоляции представлен частично в форме отсутствия желания вступать в коммуникативные контакты с окружающими, в том числе близкими;</p>	<p>- Отмечаются значительные трудности в поиске работы, трудности при вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- значительные трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами или невозможность выполнения прежней профессиональной деятельности;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
		психической устойчивости в условиях выполнения профессиональной деятельности	социальной изоляции; - физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач отвечает возрастным нормам или незначительно повышена.	- быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач.	- значительные трудности при интеграции в коллектив, социум или невозможность социальной адаптации; - синдром социальной изоляции представлен полностью, наблюдается отказ от социальных контактов; - быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач.
Анатомо-физиологический уровень					
Химиотерапия: Cyclophosphamide	Раздел s1 Структуры нервной системы 410 Функции сердца b415 Функции кровеносных сосудов	- оценка сердечной деятельности; - оценка АД; - оценка функции мочеиспускания; - отеки нижних конечностей;	- отсутствуют явления нарушений сердечной деятельности; - АД соответствует индивидуальной норме;	- учащенное или неритмичное сердцебиение; - выражена отечность стоп и лодыжек; - незначительная лабильность АД, купируемая нормотензивными/гипотензивными препаратами;	- сердечная недостаточность; - одышка в покое и при минимальных физических нагрузках; - выражена отечность стоп и лодыжек;

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>b420 Функции артериального давления</p> <p>b640-b679 Половые и репродуктивные функции</p> <p>b435 Функции иммунной системы</p> <p>d450-d469 Ходьба и передвижение</p> <p>b455 Функции толерантности к физической нагрузке</p> <p>b4550 Общая физическая выносливость</p> <p>b4551 Аэробный резерв</p> <p>b4552 Утомляемость</p>	<p>- нарушении функции яичников;</p> <p>- тошнота, рвота;</p> <p>- уровень физической активности, соответствующий возрасту;</p> <p>- передвижение во время функциональных действий;</p> <p>с или без использования вспомогательных технологий;</p> <p>- толерантность к физическим нагрузкам;</p> <p>- аэробная выносливость;</p> <p>- уровень утомляемости;</p>	<p>- тошнота отсутствует или слабо выражена;</p> <p>- рвота отсутствует;</p> <p>- отек нижних конечностей выражен незначительно и носит проходящий характер;</p> <p>- двигательная активность в целом не нарушена, соответствует возрасту;</p> <p>- уровень утомляемости прежний или незначительно повышен;</p> <p>- уровень выносливости прежний или незначительно снижен;</p> <p>- незначительно снижена</p>	<p>- тошнота умерено выражена, частично или полностью купируется антиэметическими препаратами;</p> <p>- рвота отсутствует;</p> <p>- анемия I ст.;</p> <p>- головокружение при смене положения;</p> <p>- выраженная головная боль;</p> <p>- двигательная активность снижена, не соответствует возрасту;</p> <p>- пациент быстро утомляется;</p> <p>- уровень выносливости незначительно снижен;</p> <p>- незначительно снижена способность к манипулированию предметами;</p> <p>- незначительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- незначительное снижение физической выносливости;</p>	<p>- острая предсердная или желудочковая аритмия;</p> <p>- тромбоцитопения, лейкопения;</p> <p>- анемия II;</p> <p>- лабильность АД;</p> <p>- выраженная тошнота, рвота;</p> <p>- учащенное, болезненное или затрудненное мочеиспускание;</p> <p>- головокружение при смене положения;</p> <p>- выраженная головная боль;</p> <p>- снижение остроты зрения;</p> <p>- двигательная активность значительно снижена, большую часть времени пациент проводит в постели;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<p>способность к манипулированию предметами;</p> <p>- сохранность или незначительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- сохранность или незначительное снижение физической выносливости;</p> <p>- аэробный резерв снижен, одышка обычных физических нагрузках.</p>	<p>- аэробный резерв снижен, одышка при минимальных физических нагрузках.</p>	<p>- пациент быстро утомляется;</p> <p>- значительно снижена способность к манипулированию предметами;</p> <p>- значительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- значительное снижение физической выносливости.</p>
Психофизиологический уровень					
	<p>b110 Функции сознания</p> <p>b114 Функции ориентированности</p> <p>b122 Глобальные психосоциальные функции</p>	<p>- оценка состояния сознания;</p> <p>- оценка скорости психомоторных реакций;</p> <p>- оценка сохранности и функционирования высших психических функций (память,</p>	<p>- ясное сознание, правильная ориентировка во времени, пространстве и личности;</p> <p>- уровень когнитивного развития</p>	<p>- ясное сознание, правильная ориентировка во времени, пространстве и личности;</p> <p>- когнитивный уровень снижен, но структуры ГМ сохранны;</p> <p>- скорость психомоторных реакций снижена, отмечается заторможенность;</p>	<p>- явления спутанности сознания, явления временной дезориентации;</p> <p>- обманы восприятия;</p> <p>- когнитивный уровень значительно снижен,</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>b126 Темперамент и личностные функции</p> <p>b130 Волевые и побудительные функции</p> <p>b134 Функции сна</p> <p>b140 Функции внимания</p> <p>b147 Психомоторные функции</p> <p>b152 Функции эмоций</p> <p>b160 Функции мышления</p> <p>b164 Познавательные функции высокого уровня</p> <p>d240 Преодоление стресса и других</p>	<p>внимание, мышление, восприятие);</p> <p>- оценка качества ночного сна;</p> <p>- оценка интенсивности и условий манифестации психических реакций;</p> <p>- оценка способности совладания со стрессом;</p> <p>- оценка когнитивных функций</p>	<p>соответствует возрасту;</p> <p>- скорость психомоторных реакций незначительно снижена или сохранена;</p> <p>- память на недавние события незначительно снижена или сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, сосредоточение внимания незначительно снижено или сохранено в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, содержательность мышления незначительно снижена (без утраты контекста диалога) или</p>	<p>- память на недавние события и/или события прошлого, имена, лица снижена, но пациент узнает знакомых людей, называет предметы, ориентирован в пространстве и личности;</p> <p>- концентрация внимания снижена, быстрая утомляемость, низкая или высокая лабильность внимания;</p> <p>- лабильность мышления, редкая утрата контекста диалога;</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие симптомы психического расстройства, манифестирующие в течение 4-х месяцев и дольше.</p>	<p>нарушены структуры ГМ;</p> <p>- скорость психомоторных реакций значительно снижена, заторможенность;</p> <p>- отмечается двигательная расторможенность;</p> <p>- память на события настоящего и прошлого значительно снижена;</p> <p>- есть симптомы кратковременной дезориентации в пространстве;</p> <p>- концентрация внимания значительно снижена;</p> <p>- признаки нарушения мышления: вязкость, склонность к беспредметным рассуждениям;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	психологических нагрузок		сохранена в прежнем объеме; - психоэмоциональный фон стабильный или пациент демонстрирует психические реакции по типу нозогений, манифестирующие в течении от 3 недель до 3-х месяцев.		- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие признаки психического расстройства, манифестирующие в течение 4-х и более месяцев.
Социально-бытовой уровень					
	d230 Выполнение повседневного распорядка d510 Мытье d540 Одевание d550 Прием пищи d560 Питье d570 Забота о своем здоровье	- уровень мотивации, воли к деятельности; - уровень самообслуживания; - планирование и анализ задачи; - ловкость и координация; - рискованное поведение.	- навыки самообслуживания сохранены или незначительно снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности, незначительных болевых ощущений;	- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности; - мотивация к деятельности снижена в ситуации утомляемости; - воля к деятельности незначительно снижена, отмечается тенденция астенизации, манифестация астено-апатичных реакций;	- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности - мотивация к деятельности значительно снижена; - воля к деятельности значительно снижена, отмечаются реакции апатии,

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>d630 Приготовление пищи</p> <p>d640 Выполнение работы по дому</p>		<ul style="list-style-type: none"> - мотивация к деятельности сохранена или незначительно снижена в ситуации утомляемости; - аппетит достаточный или незначительно снижен; - сохранен или не критично снижен навык планирования и распределения времени с учетом физического состояния и трудности задачи; - сохранена координация движений; - низкий уровень рискованного поведения: соблюдение рекомендаций лечащего врача и мед. персонала, 	<ul style="list-style-type: none"> - аппетит снижен; - навыки планирования значительно снижены, пациент не способен соотносить особенности физического состояния и сложность выполняемых задач; - незначительно нарушена координация движений; - отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, тенденция рискованного поведения. 	<ul style="list-style-type: none"> - отказ от еды; - значительное снижение опрятности, упорядоченности в поведении; - пациент не способен выполнять работу по дому; - значительно нарушена координация движений; - отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, злоупотребление алкоголем, ПАВ, табакокурением.

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			отказ от злоупотребления спиртными напитками, табакокурением, ПАВ.		
Социально-средовый уровень					
	d760 Семейные отношения d770 Интимные отношения b640 Сексуальные функции	<ul style="list-style-type: none"> - включенность в социальное взаимодействие; - включенность в межличностные отношения с партнером, в том числе интимные, сексуальные; - включенность в отношения с детьми, близкими родственника. 	<ul style="list-style-type: none"> - интимные отношения с супругом прежние, сексуальная жизнь активная или незначительно ограничена в связи с функциональным состоянием в п/о период; - уровень коммуникации с близкими незначительно снижен или прежний; - отмечаются незначительные трудности, конфликтность в 	<ul style="list-style-type: none"> - отношения с партнером конфликтные, снижение качества сексуальной жизни, снижение либидо; - снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается эмоциональная изоляция пациента, замкнутость, погруженность в собственные переживания; - отмечается конфликтность в отношениях с детьми, отстраненность, либо тенденции гиперопеки. 	<ul style="list-style-type: none"> - отношения с партнером конфликтные, сексуальная жизнь отсутствует; - значительно снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается полная социальная изоляция пациента, вплоть до отказа в коммуникации; - отмечается отказ участия в жизни детей, либо тенденции гиперопеки,

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			отношения с детьми, партнером.		чрезмерная фиксация на личности близкого.
	Профессионально-трудовой уровень				
	d845 Получение работы, выполнение и прекращение трудовых отношений	<p>- уровень физического функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности;</p> <p>- уровень психического функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности</p> <p>- адаптация к условиям труда;</p> <p>- уровень физической и психической устойчивости в условиях выполнения профессиональной деятельности</p>	<p>- Трудности в поиске работы минимальные или отсутствуют;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач минимальны или отсутствуют;</p> <p>- трудности при интеграции в новый коллектив, возвращении в прежний минимальны или отсутствуют;</p> <p>- отсутствует синдром социальной изоляции;</p> <p>- физическая, психическая утомляемость при выполнении</p>	<p>- Отмечаются трудности в поиске работы, трудности при вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами;</p> <p>- трудности при интеграции в коллектив, социум;</p> <p>- синдром социальной изоляции представлен частично в форме отсутствия желания вступать в коммуникативные контакты с окружающими, в том числе близкими;</p> <p>- быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач.</p>	<p>- Отмечаются значительные трудности в поиске работы, трудности при вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- значительные трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами или невозможность выполнения прежней профессиональной деятельности;</p> <p>- значительные трудности при интеграции в коллектив, социум или невозможность социальной адаптации;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			профессиональных задач отвечает возрастным нормам или незначительно повышена.		- синдром социальной изоляции представлен полностью, наблюдается отказ от социальных контактов; - быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач.
Анатомо-физиологический уровень					
Химиотерапия: Taxane	Раздел s1 Структуры нервной системы b435 Функции иммунной системы d450-d469 Ходьба и передвижение b455 Функции толерантности к физической нагрузке	- полинейропатия; - отеки нижних конечностей; - тошнота, рвота; - уровень физической активности, соответствующий возрасту; - передвижение во время функциональных действий;	- слабость в стопах и кистях; - тошнота отсутствует или слабо выражена; - снижение чувствительности; - рвота отсутствует; - отек нижних и/или верхних конечностей выражен незначительно или отсутствует;	- выражена отечность верхних/нижних конечностей; - выраженная боль; - ощущения жжения в конечностях; - потливость; - тошнота умерено выражена, частично или полностью купируется антиэметическими препаратами; - рвота отсутствует; - головокружение при смене положения, незначительное	- выраженная слабость мышц верхних и нижних конечностей; - снижение чувствительности, рефлексов; - выраженные болевые ощущения; - мышечная напряженность, произвольные подергивания мышц; - выраженная потливость;

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>b4550 Общая физическая выносливость</p> <p>b4551 Аэробный резерв</p> <p>b4552 Утомляемость</p>	<p>с или без использования вспомогательных технологий;</p> <p>- толерантность к физическим нагрузкам;</p> <p>- аэробная выносливость;</p> <p>- уровень утомляемости;</p>	<p>- двигательная активность в целом не нарушена, соответствует возрасту;</p> <p>- уровень утомляемости прежний или незначительно повышен;</p> <p>- уровень выносливости прежний или незначительно снижен;</p> <p>- незначительно снижена способность к манипулированию предметами;</p> <p>- сохранность или незначительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- сохранность или незначительное снижение</p>	<p>нарушение координации движений;</p> <p>- выраженная головная боль;</p> <p>- двигательная активность снижена, не соответствует возрасту;</p> <p>- пациент быстро утомляется;</p> <p>- уровень выносливости незначительно снижен;</p> <p>- незначительно снижена способность к манипулированию предметами;</p> <p>- незначительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- незначительное снижение физической выносливости;</p> <p>- аэробный резерв снижен, одышка при минимальных физических нагрузках.</p>	<p>- усиленное сердцебиение;</p> <p>- головокружения, сложности с равновесием, нарушение координации (особенно с закрытыми глазами);</p> <p>- одышка в покое и при минимальных физических нагрузках;</p> <p>- тромбоцитопения, лейкопения;</p> <p>- анемия II или III ст.;</p> <p>- лабильность АД;</p> <p>- выраженная тошнота, рвота;</p> <p>- выраженная головная боль;</p> <p>- двигательная активность значительно снижена, большую часть времени пациент проводит в постели;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<p>физической выносливости;</p> <p>- аэробный резерв снижен, одышка обычных физических нагрузках.</p>		<p>- пациент быстро утомляется;</p> <p>- значительно снижена способность к манипулированию предметами;</p> <p>- значительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- значительное снижение физической выносливости.</p>
Психофизиологический уровень					
	<p>b110 Функции сознания</p> <p>b114 Функции ориентированности</p> <p>b122 Глобальные психо-социальные функции</p> <p>b126 Темперамент и личностные функции</p>	<p>- оценка состояния сознания;</p> <p>- оценка скорости психомоторных реакций;</p> <p>- оценка сохранности и функционирования высших психических функций (память, внимание, мышление, восприятие);</p>	<p>- ясное сознание, правильная ориентировка во времени, пространстве и личности;</p> <p>- уровень когнитивного развития соответствует возрасту;</p> <p>- скорость психомоторных реакций</p>	<p>- ясное сознание, правильная ориентировка во времени, пространстве и личности;</p> <p>- когнитивный уровень снижен, но структуры ГМ сохранны;</p> <p>- скорость психомоторных реакций снижена, отмечается заторможенность;</p> <p>- память на недавние события и/или события прошлого, имена, лица снижена, но пациент узнает знакомых людей, называет</p>	<p>- явления спутанности сознания, явления временной дезориентации;</p> <p>- обманы восприятия;</p> <p>- когнитивный уровень значительно снижен, нарушены структуры ГМ;</p> <p>- скорость психомоторных реакций значительно</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>b130 Волевые и побудительные функции</p> <p>b134 Функции сна</p> <p>b140 Функции внимания</p> <p>b147 Психомоторные функции</p> <p>b152 Функции эмоций</p> <p>b160 Функции мышления</p> <p>b164 Познавательные функции высокого уровня</p> <p>d240 Преодоление стресса и других психологических нагрузок</p>	<p>- оценка качества ночного сна;</p> <p>- оценка интенсивности и условий манифестации психических реакций;</p> <p>- оценка способности совладания со стрессом;</p> <p>- оценка когнитивных функций</p>	<p>незначительно снижена или сохранена;</p> <p>- память на недавние события незначительно снижена или сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, сосредоточение внимания незначительно снижено или сохранено в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, содержательность мышления незначительно снижена (без утраты контекста диалога) или сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- психоэмоциональный фон стабильный или пациент</p>	<p>предметы, ориентирован в пространстве и личности;</p> <p>- концентрация внимания снижена, быстрая утомляемость, низкая или высокая лабильность внимания;</p> <p>- лабильность мышления, редкая утрата контекста диалога;</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие симптомы психического расстройства, манифестирующие в течение 4-х месяцев и дольше.</p>	<p>снижена, заторможенность;</p> <p>- отмечается двигательная расторможенность;</p> <p>- память на события настоящего и прошлого значительно снижена;</p> <p>- есть симптомы кратковременной дезориентации в пространстве;</p> <p>- концентрация внимания значительно снижена;</p> <p>- признаки нарушения мышления: вязкость, склонность к беспредметным рассуждениям;</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие признаки психического расстройства, манифестирующие в</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			демонстрирует психические реакции по типу нозогений, манифестирующие в течении от 3 недель до 3-х месяцев.		течение 4-х и более месяцев.
Социально-бытовой уровень					
	<p>d230 Выполнение повседневного распорядка</p> <p>d510 Мытье</p> <p>d540 Одевание</p> <p>d550 Прием пищи</p> <p>d560 Питье</p> <p>d570 Забота о своем здоровье</p> <p>d630 Приготовление пищи</p> <p>d640 Выполнение работы по дому</p>	<p>- уровень мотивации, воли к деятельности;</p> <p>- уровень самообслуживания;</p> <p>- планирование и анализ задачи;</p> <p>- ловкость и координация;</p> <p>- рисковое поведение.</p>	<p>- навыки самообслуживания сохранены или незначительно снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности, незначительных болевых ощущений;</p> <p>- мотивация к деятельности сохранена или незначительно снижена в ситуации утомляемости;</p>	<p>- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности;</p> <p>- мотивация к деятельности снижена в ситуации утомляемости;</p> <p>- воля к деятельности незначительно снижена, отмечается тенденция астенизации, манифестация астено-апатичных реакций;</p> <p>- аппетит снижен;</p> <p>- навыки планирования значительно снижены, пациент не способен соотносить особенности физического</p>	<p>- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности - мотивация к деятельности значительно снижена;</p> <p>- воля к деятельности значительно снижена, отмечаются реакции апатии,</p> <p>- отказ от еды;</p> <p>- значительное снижение опрятности, упорядоченности в поведении;</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<ul style="list-style-type: none"> - аппетит достаточный или незначительно снижен; - сохранен или незначительно снижен навык планирования и распределения времени с учетом физического состояния и трудности задачи; - сохранена координация движений; - низкий уровень рискованного поведения: соблюдение рекомендаций лечащего врача и мед. персонала, отказ от злоупотребления спиртными напитками, табакокурением, ПАВ. 	<ul style="list-style-type: none"> состояния и сложность выполняемых задач; - незначительно нарушена координация движений; - отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, тенденция рискованного поведения. 	<ul style="list-style-type: none"> - пациент не способен выполнять работу по дому; - значительно нарушена координация движений; - отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, злоупотребление алкоголем, ПАВ, табакокурением.

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	Социально-средовый уровень				
	d760 Семейные отношения d770 Интимные отношения b640 Сексуальные функции	<ul style="list-style-type: none"> - включенность в социальное взаимодействие; - включенность в межличностные отношения с партнером, в том числе интимные, сексуальные; - включенность в отношения с детьми, близкими родственника. 	<ul style="list-style-type: none"> - интимные отношения с супругом прежние, сексуальная жизнь активная или незначительно ограничена в связи с функциональным состоянием в п/о период; - уровень коммуникации с близкими незначительно снижен или прежний; - отмечаются незначительные трудности, конфликтность в отношениях с детьми, партнером. 	<ul style="list-style-type: none"> - отношения с партнером конфликтные, снижение качества сексуальной жизни, снижение либидо; - снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается эмоциональная изоляция пациента, замкнутость, погруженность в собственные переживания; - отмечается конфликтность в отношениях с детьми, отстраненность, либо тенденции гиперопеки. 	<ul style="list-style-type: none"> - отношения с партнером конфликтные, сексуальная жизнь отсутствует; - значительно снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается полная социальная изоляция пациента, вплоть до отказа в коммуникации; - отмечается отказ участия в жизни детей, либо тенденции гиперопеки, чрезмерная фиксация на личности близкого.
	Профессионально-трудовой уровень				
	d845 Получение работы, выполнение и прекращение	<ul style="list-style-type: none"> - уровень физического функционирования для выполнения 	<ul style="list-style-type: none"> - Трудности в поиске работы 	<ul style="list-style-type: none"> - Отмечаются трудности в поиске работы, трудности при 	<ul style="list-style-type: none"> - Отмечаются значительные трудности в поиске работы, трудности при

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>трудовых отношений</p>	<p>специфической профессиональной деятельности;</p> <p>- уровень психического функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности</p> <p>- адаптация к условиям труда;</p> <p>- уровень физической и психической устойчивости в условиях выполнения профессиональной деятельности</p>	<p>минимальные или отсутствуют;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач минимальны или отсутствуют;</p> <p>- трудности при интеграции в новый коллектив, возвращении в прежний минимальны или отсутствуют;</p> <p>- отсутствует синдром социальной изоляции;</p> <p>- физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач отвечает возрастным нормам или незначительно повышена.</p>	<p>вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами;</p> <p>- трудности при интеграции в коллектив, социум;</p> <p>- синдром социальной изоляции представлен частично в форме отсутствия желания вступать в коммуникативные контакты с окружающими, в том числе близкими;</p> <p>- быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач.</p>	<p>вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- значительные трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами или невозможность выполнения прежней профессиональной деятельности;</p> <p>- значительные трудности при интеграции в коллектив, социум или невозможность социальной адаптации;</p> <p>- синдром социальной изоляции представлен полностью, наблюдается отказ от социальных контактов;</p> <p>- быстрая физическая, психическая утомляемость при</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
					выполнении профессиональных задач.
Лучевая терапия	<p>s8 Кожа и относящиеся к ней структуры</p> <p>b2 Сенсорные функции и боль</p> <p>b7100-b7203 Подвижность</p> <p>d430-d449 Перенос, перемещение и манипулирование объектами</p> <p>b455 Функции толерантности к физической нагрузке</p> <p>b4550 Общая физическая выносливость</p> <p>b4551 Аэробный резерв</p>	<p>- оценка структуры кожного покрова;</p> <p>- оценка силы верхней конечности, диапазона движения;</p> <p>- совместное активное и пассивное движение;</p> <p>- длина мышц, растяжимость мягкой ткани и гибкость;</p> <p>- чувствительность в кожных покровах;</p> <p>- особенности рубцовой ткани</p> <p>- особенности кожного покрова</p> <p>- боль в определенных частях тела;</p>	<p>- двигательная активность в целом не нарушена, незначительное сокращение в объеме/амплитуде движений верхней конечности;</p> <p>- умеренная болезненность в области облучения;</p> <p>- чувствительность в области облучения незначительно нарушена;</p> <p>- уровень утомляемости прежний или незначительно повышен;</p> <p>- уровень выносливости</p>	<p>- область облучения без признаков воспаления;</p> <p>- двигательная активность в целом снижена, имеется сокращение в объеме/амплитуде движений верхней конечности;</p> <p>- выраженная болезненность в области облучения;</p> <p>- незначительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- незначительное снижение физической выносливости;</p> <p>- значительное нарушение чувствительно кожных покровов в области облучения;</p> <p>- способность к манипулированию предметами снижена, значительные трудности в подвижности мелких суставов, моторике кистей рук;</p>	<p>- область облучения воспалена;</p> <p>- двигательная активность значительно снижена, имеется значительное сокращение в объеме/амплитуде движений верхней конечности;</p> <p>- выраженная болезненность в области облучения;</p> <p>- значительное снижение мышечного тонуса;</p> <p>- способность к манипулированию предметами значительно снижена, пациент не способен выполнять хватательные</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	b4552 Утомляемость b280 Ощущение боли	<ul style="list-style-type: none"> - мышечная сила и выносливость во время функциональных действий; - способность к манипулированию предметами/объектами (перенос, поднятие, толкание, подтягивание, вращение); - мышечное напряжение; - оценка аэробного резерва; - оценка утомляемости и уровня выносливости во время минимальных физических нагрузок. 	<ul style="list-style-type: none"> прежний или незначительно снижен; - незначительно снижена способность к манипулированию предметами; - незначительно снижена подвижность мелких суставов, незначительно снижена мелкая моторика рук; - сохранность или незначительное снижение мышечного тонуса; - сохранность или незначительное снижение физической выносливости; - аэробный резерв снижен. 	<ul style="list-style-type: none"> - пациент быстро утомляется; - аэробный резерв значительно снижен, отмечается одышка во время выполнения обычной физической нагрузки. 	<ul style="list-style-type: none"> движения, вращательные движения; - значительное снижение толерантности к минимальным физическим нагрузкам; - быстрая утомляемость; - значительное снижение аэробного резерва, одышка при смене положения или затруднения дыхания в покое
Психофизиологический уровень					

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>b122 Глобальные психо-социальные функции</p> <p>b126 Темперамент и личностные функции</p> <p>b130 Волевые и побудительные функции</p> <p>b134 Функции сна</p> <p>b140 Функции внимания</p> <p>b147 Психомоторные функции</p> <p>b152 Функции эмоций</p> <p>b160 Функции мышления</p> <p>b164 Познавательные функции высокого уровня</p>	<p>- оценка скорости психомоторных реакций;</p> <p>- оценка сохранности и функционирования высших психических функций (память, внимание, мышление, восприятие);</p> <p>- оценка качества ночного сна;</p> <p>- оценка интенсивности и условий манифестации психических реакций;</p> <p>- оценка способности совладания со стрессом;</p> <p>- оценка когнитивных функций</p>	<p>- уровень когнитивного развития соответствует возрасту;</p> <p>- скорость психомоторных реакций незначительно снижена или сохранена;</p> <p>- память на недавние события незначительно снижена или сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, сосредоточение внимания незначительно снижено или сохранено в прежнем объеме;</p> <p>- лабильность, содержательность мышления незначительно снижена (без</p>	<p>- когнитивный уровень снижен, но структуры ГМ сохранены;</p> <p>- скорость психомоторных реакций снижена, отмечается заторможенность;</p> <p>- память на недавние события и/или события прошлого, имена, лица снижена, но пациент узнает знакомых людей, называет предметы, ориентирован в пространстве и личности;</p> <p>- концентрация внимания снижена, быстрая утомляемость, низкая или высокая лабильность внимания;</p> <p>- лабильность мышления, редкая утрата контекста диалога;</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие симптомы психического расстройства, манифестирующие в течение 4-х месяцев и дольше.</p>	<p>- когнитивный уровень значительно снижен, нарушены структуры ГМ;</p> <p>- скорость психомоторных реакций значительно снижена, заторможенность;</p> <p>- отмечается двигательная расторможенность;</p> <p>- память на события настоящего и прошлого значительно снижена;</p> <p>- есть симптомы кратковременной дезориентации в пространстве;</p> <p>- концентрация внимания значительно снижена;</p> <p>- признаки нарушения мышления: вязкость, склонность к</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	d240 Преодоление стресса и других психологических нагрузок		<p>утраты контекста диалога) или сохранена в прежнем объеме;</p> <p>- психоэмоциональный фон стабильный или пациент демонстрирует психические реакции по типу нозогений, манифестирующие в течении от 3 недель до 3-х месяцев.</p>		<p>беспредметным рассуждениям;</p> <p>- психоэмоциональный фон нестабильный, имеются стойкие признаки психического расстройства, манифестирующие в течение 4-х и более месяцев.</p>
Социально-бытовой уровень					
	<p>d230 Выполнение повседневного распорядка</p> <p>d510 Мытье</p> <p>d540 Одевание</p> <p>d550 Прием пищи</p> <p>d560 Питье</p> <p>d570 Забота о своем здоровье</p>	<p>- уровень мотивации, воли к деятельности;</p> <p>- уровень самообслуживания;</p> <p>- планирование и анализ задачи;</p> <p>- ловкость и координация;</p>	<p>- навыки самообслуживания сохранены или незначительно снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности, незначительных</p>	<p>- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности;</p> <p>- мотивация к деятельности снижена в ситуации утомляемости;</p> <p>- воля к деятельности незначительно снижена, отмечается тенденция</p>	<p>- навыки самообслуживания снижены за счет функциональных ограничений верхней конечности - мотивация к деятельности значительно снижена;</p> <p>- воля к деятельности значительна снижена,</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
	<p>d630 Приготовление пищи</p> <p>d640 Выполнение работы по дому</p>	<p>- рисковое поведение.</p>	<p>болевых ощущений;</p> <p>- мотивация к деятельности сохранена или незначительно снижена в ситуации утомляемости;</p> <p>- аппетит достаточный или незначительно снижен;</p> <p>- сохранен или не критично снижен навык планирования и распределения времени с учетом физического состояния и трудности задачи;</p> <p>- сохранена координация движений;</p> <p>- низкий уровень рискованного поведения: соблюдение</p>	<p>астенизации, манифестация астено-апатичных реакций;</p> <p>- аппетит снижен;</p> <p>- навыки планирования значительно снижены, пациент не способен соотносить особенности физического состояния и сложность выполняемых задач;</p> <p>- незначительно нарушена координация движений;</p> <p>- отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, тенденция рискованного поведения.</p>	<p>отмечаются реакции апатии,</p> <p>- отказ от еды;</p> <p>- значительное снижение опрятности, упорядоченности в поведении;</p> <p>- пациент не способен выполнять работу по дому;</p> <p>- значительно нарушена координация движений;</p> <p>- отмечается пренебрежение рекомендациями лечащего врача, злоупотребление алкоголем, ПАВ, табакокурением.</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<p>рекомендаций лечащего врача и мед. персонала, отказ от злоупотребления спиртными напитками, табакокурением, ПАВ.</p>		
Социально-средовый уровень					
	<p>d760 Семейные отношения d770 Интимные отношения b640 Сексуальные функции</p>	<p>- включенность в социальное взаимодействие; - включенность в межличностные отношения с партнером, в том числе интимные, сексуальные; - включенность в отношения с детьми, близкими родственника; - оценка образа тела, сексуальности, нарциссичности.</p>	<p>- интимные отношения с супругом прежние, сексуальная жизнь активная или незначительно ограничена в связи с функциональным состоянием в п/о период; - уровень коммуникации с близкими незначительно снижен или прежний;</p>	<p>- отношения с партнером конфликтные, снижение качества сексуальной жизни, снижение либидо; - снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается эмоциональная изоляция пациента, замкнутость, погруженность в собственные переживания; - отмечается конфликтность в отношениях с детьми, отстраненность, либо тенденции гиперопеки;</p>	<p>- отношения с партнером конфликтные, сексуальная жизнь отсутствует; - значительно снижен уровень коммуникации с родственниками и внутри семьи, отмечается полная социальная изоляция пациента, вплоть до отказа в коммуникации; - отмечается отказ участия в жизни детей, либо тенденции</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
			<p>- отмечаются незначительные трудности, конфликтность в отношениях с детьми, партнером;</p> <p>- адекватная объему операции оценка образа тела, сексуальности, нормальное проявление нарциссизма в оценке себя.</p>	<p>- присутствуют некоторые признаки дисморфофобии, патологизация нарциссизма (в форме самоупреков, недовольства собой), снижение чувства женственности, сексуальности.</p>	<p>гиперопеки, чрезмерная фиксация на личности близкого;</p> <p>- выраженные симптомы дисморфофобии, отрицание сексуальности, женственности.</p>
Профессионально-трудоустройственный уровень					
	d845 Получение работы, выполнение и прекращение трудовых отношений	<p>- Уровень физического функционирования для выполнения специфической профессиональной деятельности</p> <p>- Уровень психического функционирования для выполнения специфической</p>	<p>- Трудности в поиске работы минимальные или отсутствуют;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач минимальны или отсутствуют;</p> <p>- трудности при интеграции в новый</p>	<p>- Отмечаются трудности в поиске работы, трудности при вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологическими, психическими или соматическими причинами;</p>	<p>- Отмечаются значительные трудности в поиске работы, трудности при вступлении в трудовые отношения;</p> <p>- значительные трудности при выполнении профессиональных задач, обусловленные психофизиологически</p>

Вид лечения	Домены МКФ	Оценка уровня функционирования	Высокий РП	Средний РП	Низкий РП
		<p>профессиональной деятельности</p> <ul style="list-style-type: none"> - адаптация к условиям труда; - уровень физической и психической устойчивости в условиях выполнения профессиональной деятельности 	<p>коллектив, возвращении в прежний минимальны или отсутствуют;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует синдром социальной изоляции; - физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач отвечает возрастным нормам или незначительно повышена. 	<ul style="list-style-type: none"> - трудности при интеграции в коллектив, социум; - синдром социальной изоляции представлен частично в форме отсутствия желания вступать в коммуникативные контакты с окружающими, в том числе близкими; - быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач. 	<ul style="list-style-type: none"> ми, психическими или соматическими причинами или невозможность выполнения прежней профессиональной деятельности; - значительные трудности при интеграции в коллектив, социум или невозможность социальной адаптации; - синдром социальной изоляции представлен полностью, наблюдается отказ от социальных контактов; - быстрая физическая, психическая утомляемость при выполнении профессиональных задач.